

ПОДГОТОВКА К ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИИ

▼ За 48 часов *(по согласованию с кардиологом)*

Отмените антикоагулянты (ксарелто, прадакса, эликвис, брилинта, варфарин и т.д.) по согласованию с лечащим врачом. Антиагреганты (аспирин, плавикс) отменять не нужно! В день исследования не принимайте препараты железа, висмута, активированный уголь.

▼ Накануне исследования

Легкий ужин не позднее 19.00.

Если исследование будет выполнено в первой половине дня (до 14.00), то необходимо прийти натощак. Ночью и утром нельзя есть. Пить прозрачные жидкости можно не позднее, чем за 2 часа.

Если исследование будет выполнено во второй половине дня (после 14.00), то можно позавтракать не позднее, чем за 8 часов до гастроскопии. Пить прозрачные жидкости можно не позднее, чем за 2 часа.

▼ Если Вам предстоит исследование с внутривенной седацией

Последний прием жидкости за 4 часа (за исключением приема жизненно важных препаратов).

▼ Если Вы принимаете семаглутид (оземпик, семавик, квинсента, седжиро и т.д.), то:

При исследовании без внутривенной седации последний прием пищи должен быть за сутки до исследования. Можно пить прозрачные жидкости: воду, осветленные соки, чай без молока.

Исследование с внутривенной седацией можно выполнить после отмены 2-х инъекций препарата по согласованию с лечащим врачом.

Что нужно взять с собой

- 1 Направление лечащего врача из другого лечебного учреждения по форме 057-У, либо назначение врача нашей клиники.
- 3 **Протоколы предыдущих исследований и выписки из стационара;** если у Вас бронхиальная астма — ингалятор; при сахарном диабете — сахар под язык или леденец при необходимости; при ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии – препараты, которые Вы обычно принимаете.
- 4 Если у Вас хроническое заболевание — утром, за 2-3 часа до исследования обязательно примите все препараты для постоянного приема, запивая не более 50 мл воды.
- 5 Если Вам предстоит исследование с внутривенной седацией, Вам необходимо иметь при себе ЭКГ и общий анализ крови давностью не более 14 дней.
- !! После исследования в условиях внутривенной седации нельзя садиться за руль в течение суток.
- !! Если планируется эндоскопическое удаление полипов, то необходимо сначала прийти на консультацию к эндоскописту с протоколом (+ фото и/или видео) предыдущего эндоскопического и гистологического исследования.